V
C.º 1556-70

© Biblioteca Nacional de España

© Biblioteca Nacional de España

C/556-FD

EXTRAÍDA DE LOS "ANALES DEL MUSEO NACIONAL" DE MONTEVIDEO
Fascículo XI—Tomo II

LA VEGETACION URUGUAYA

Plantas
que se hacen distinguir por alguna propiedad útil ó perjudicial

POR

MARIANO B. BERRO

EXPOSICION DEL LIBRO URUGUAYO
MADRID – BARCELONA
1929
DONACION DE LA BIBLIOTECA NACIONAL
DE MONTEVIDEO A LA DE MADRID

MONTEVIDEO
ESTABLECIMIENTO TIPO-LITOGRÁFICO «ORIENTAL»
Calle de los Treinta y Tres núm. 106

1899

© Biblioteca Nacional de España

© Biblioteca Nacional de España

LA VEGETACION URUGUAYA

© Biblioteca Nacional de España

Al Sr. Prof. don José Arechavaleta, como muestra de mi alta estima y gratitud, dedícole este trabajo.

© Biblioteca Nacional de España

EXTRAÍDA DE LOS "ANALES DEL MUSEO NACIONAL" DE MONTEVIDEO
Fascículo XI—Tomo II

LA

VEGETACION URUGUAYA

Plantas

que se hacen distinguir por alguna propiedad

útil ó perjudicial

POR

MARIANO B. BERRO



MONTEVIDEO
ESTABLECIMIENTO TIPO-LITOGRÁFICO «ORIENTAL»
Calle de los Treinta y Tres núm. 106
—
1899

© Biblioteca Nacional de España

© Biblioteca Nacional de España

AL LECTOR

Natural es que este trabajo entrañe algunos errores, ya por falta de la necesaria preparación científica ó ya por haber carecido de elementos literarios que me sirviesen de segura guía; pero, á pesar de esas probables deficiencias, he pensado que algún servicio puede prestar la publicidad y por eso lo entrego á la prensa. Quizá más adelante me sea dado depurarlo de sus defectos y tendré entonces oportunidad de agregar á cada planta una descripción que permita reconocerla sin mayor esfuerzo, aumentando este trabajo con otros interesantes vegetales que viven en nuestros campos, montes y aguas.

Por último debo declarar que me consideraré recompensado de mi laboriosa tarea, si esta publicación propende en algo á aumentar entre mis compatriotas la afición á los estudios botánicos tan útiles como agradables.

Montevideo, Enero 20 de 1899.

M. B. Berro.

© Biblioteca Nacional de España

OBRAS DE CONSULTAS

E. Gibert—Enumeratio plantarum sponte nascentium agro montevidensi, 1873.

J. D. Hooker y B. Daydon Jackson Index kewensis, 1893.

Pr. J. Arechavaleta—Las gramíneas uruguayas, 1894.

Pr. J. Arechavaleta—Breves apuntes de las especies vegetales de la Flora Uruguaya, 1889.

J. Hieronymus - Plantae diaphoricae florae argentinae, 1882.

P. G. Lorentz—La vegetación del nordeste de la Provincia de Entrerios, 1878.

P. G. Lorentz y G. Niederlein. Expedición al Río Negro, 1881.

P. G. Lorentz en R. Napp. La República Argentina, 1876.

Boletín de la Academia nacional de ciencias en Córdoba, 1874-1890.

Anales de la Sociedad científica argentina, 1876-1897.

Revista del Museo de la Plata, 1890-1896.

Actas de la Academia nacional de ciencias en Córdoba, 1875-1883.

G. Niederlein. La riqueza florestal de la República Argentina, —en S. Alcorta, Exposición universal de Paris, 1890.

J. de León. Elementos de botánica, 1887.

José M. Reyes. Descripción geográfica del territorio de la República O. del Uruguay, 1859.

Dr. C. Berg. Sobre plantas europeas que se encuentran al estado silvestre en las Repúblicas Argentina y Oriental, 1877.

Domingo Parodi. Notas sobre algunas plantas usuales del Paraguay, de Corrientes y de Misiones, (Reimpresión) 1886.

A. P. Carlosena. Procedencias botánicas y aplicaciones vulgares, 1895.

Eduardo Matoso. Cien industrias, 1893.

V. M. de Moussy. Description geographique et statistique de la Confederation Argentine, 1860.

Pr. J. Arechavaleta. Anales del Museo N. de Montevideo 1894-1898.

R. A. Philippi. Viaje al Desierto de Atacama, 1860.

Ed. André. Bromeliaceae Andreanae, 1889.

© Biblioteca Nacional de España

ACOTILEDONEAS

HONGOS

PUCCINIA Hall. (1742) Enum. 17.

Puccinia graminis Pers. Disp. Meth. p. 39, t. 3.

N. v. Polvillo.

Se desarrolla sobre las plantas de trigo y de otras gramíneas, presentándose bajo la forma de un polvo rojizo á fines de Octubre ó Noviembre.

Ecidios y *ecidiolos* se presentan en las hojas del Berberis; *uredosporas* y *teleutosporas* sobre varias especies de gramíneas: se ve sobre la epidermis, como un polvo; las hojas de aquel arbusto en la primavera, y quizá en las de otras plantas, llevan en la faz superior los *spermogamides* que guardan numerosos *spermatides* y en la inferior los ecidios que encierran los esporos que son los que van á vegetar sobre las gramíneas. En el otoño el criptógamo produce los teleutosporos que constituyen el *Polvillo negro*, que en la primavera darán lugar á los esporidios que viven en el Berberis y así se reproduce el ciclo complicado de este hongo.

La Caña de Castilla cuando se cubre con el polvo negro citado, el contacto con ella puede causar erupciones cutáneas, inflamaciones en la cara, etc. Los animales que comen forraje conteniendo polvillo, pueden sufrir daño en su salud. En Europa existe la creencia vulgar de que en los años que abunda aquel parásito es inminente alguna epizotia.

USTILAGO LK.

Ustilago segetum (Bull.) Dittm. in Sturm.

N. v. Carbón de los cereales.

Hongo que se desarrolla en la parénquima de las glumas de algunos cereales, en el eje de las espiguillas y en sus pedícelos;

© Biblioteca Nacional de España

en el primer período de su existencia presenta una materia blanda, blanquizca, formada por el micelio, produciéndose después los esporos en la forma de un polvo negro; el parásito es causa del aborto de las flores atacadas y de su esterilidad, presentándose el raquis envuelto en una materia que despide mal olor.

Ustilago maidis Icon. V. Tul. Ann. Sc. nat. (D. C.) Carda.
N. v. Tizon del maiz.

Este parásito se desarrolla sobre las brácteas de la flor ♀, sobre el tallo, las hojas ó flores ♂; —los órganos atacados se deforman, aparecen sobre ellos excrecencias esponjosas color gris ceniciento, que encierran innumerables esporos. Esas deformaciones son debidas al desarrollo del micelio del Ustilago. Está reconocido que los estiércoles frescos favorecen la presentación del hongo. Las mazorcas que han sufrido el ataque parasitario resultan de inferior calidad y son malsanas.

Tilletia Tul.
Tilletia caries Tul. in Ann. Sc. Nat.
N. v. Carie.

Se desarrolla este parásito sobre los ovarios fecundados de los trigos, impidiendo el natural crecimiento y presentando un polvo negruzco de olor fétido; los granos maduros conservan un engañoso aspecto exterior, pero son más livianos y la harina despide mal olor y es nociva. Es una plaga terrible para los trigos; se presenta también sobre el *Bromus mollis* y otras gramíneas.

Claviceps Tul.
Claviceps purpurea Tul. in Annal. Sc. Nat. III Ser. t. XX.
N. v. Cornezuelo.

Micelio filamentoso que se desarrolla en el ovario de las gramíneas; los conidios salen al traves de las glumas y por germi-

© Biblioteca Nacional de España

nación producen con rapidez el contagio en las flores, en donde aparece el Claviceps, que ataca con preferencia al centeno; la harina que produce los granos atacados, si es empleada en pan, puede producir graves desórdenes intestinales. Es un veneno y á la vez un medicamento poderoso, la ergotina, de aplicación universal.

MUCOR Mich.

Mucor mucedo L.

N. v. Moho.

Hongo que se desarrolla en las habitaciones húmedas ó piezas que permanecen cerradas, con particularidad sobre las materias orgánicas y parece no ser dañosa en sí misma para la salud.

TUBER Mich.

Tuber

N. v. Trufa.

Se conocen en Europa varias especies y algunas están destinadas á la alimentación, no habiéndose encontrado alguna que sea venenosa; estos hongos viven bajo tierra durante toda su evolución vegetativa, á diez ó menos centímetros de profundidad y la forma es siempre algo redondeada. Se encuentran en la proximidad de los árboles, alimentándose con materias vegetales en descomposicion y humus. El Dr. Spegazzini, en la Argentina, ha tenido la suerte de encontrar y determinar cinco especies y de estas dos son comestibles. No me consta que aquí se hayan encontrado, pero indudablemente debe existir alguna especie.

© Biblioteca Nacional de España

BOVISTA Fr.
Bovista Sp.?
N. v. Esponja.

Muy general en los campos, que aparece con cuerpo esférico, blanco, del tamaño de un huevo de ñandú ó mayor algunas veces, que crece con asombrosa rapidez, quebradizo, pero al madurar toma un color rojizo ó marrón y por su contestura se parece algo á las esponjas de mar. Se le da varios empleos y sobre todo para mechas de los candiles.

LIQUENES

USNEA Fr.
Usnea Hieronymi Kremp. in Bol. Ac. Nac. t. III. p. 103.
N. v. Yerba de la piedra

Vive sobre las piedras; se emplea en gargarismos en casos de llagas en la garganta; el cocimiento se aplica al lavado de heridas ó úlceras y se da también á los niños cloróticos.

EQUISETACEAS

EQUISETUM Lin. Gen. n. 1169
Equisetum ramosissimum, Desf
N. v. Cola de caballo.

Vive en lugares húmedos ó costa de los arroyos. Se asegura que al ganado vacuno, cuando pace esta planta, le daña, causándole una diarrea sanguinolenta y como resultado casos de aborto y enflaquecimiento. Tiene aplicación medicinal como diurética y enérgico astringente: detiene las hemorragias leves capilares, y combate la disenteria y gonorrea.

© Biblioteca Nacional de España

HELECHOS

ASPIDIUM SW. Syn. Fil. 42

Aspidium capense, Willd.

N. v. Calaguala.

La infusión del rizoma se administra como astringente, antiespasmádico, emenagoga y depurativa. Se da en casos de haberse recibido un susto, en partos, reumatismos y golpes.

ADIANTHUM L.

Adianthum cuneatum Langsd.

N. v. Culantrillo.

Muy general en los lugares frescos y sombríos, de formas delicadas y admirables. Se emplea como planta ornamental en los patios y se aplica la infusión como pectoral, diaforética, aromática y amarga; se da á las parturientas también.

BLECHNUM L.

Blechnum occidentale L.

N. v. Doradilla.

La infusión de este criptógamo se aplica en las afecciones pulmonares y en las dolencias causadas por cálculos en la vejiga.

ANEIMIA SW.

Aneimia tomentosa Swartz.

N. v. Doradilla.

De este helecho se extrae una goma ó resina que es de propiedad estomacal, laxante y flegmagoga; el decotado se dice ser un excelente pectoral y se da también en la supresión de los menstruos y en las inflamaciones del hígado.

© Biblioteca Nacional de España

POLYPODIUM L.

Polypodium vaccinifolium Langds.

N. v. Doradita.

Vive en los montes sobre algunos árboles. El cocimiento se administra en baños en la hidropesía; tiene propiedades astringentes y sudoríficas.

MONOCOTILEDONEAS

ORQUIDEACEAS

CHLORAEA Lindl.

Chloraea Arechavaletae Kranzl.

N. v. Boca del zapo

Planta digna de figurar en los jardines como una curiosidad agradable, por lo estraña de la forma de las flores; vive en matas aisladas y se ve más frecuentemente en los terrenos pedregosos, en Octubre y Noviembre.

ONCIDIUM Sw.

Oncidium bifolium Sims. Bot. Mag. t. 1491—Reg. Argent.

N. v. Flor de pajarito

Vive sobre los árboles, en agrupación de plantas, cuyas flores amarillas con máculos oscuros, de Octubre á Diciembre, causan hermoso efecto. Es muy buscada para colocarla en los patios ó jardines.

ESCITAMINEACEAS

CANNA L.

* **Canna glauca** L. Sp. Pl. I. Cosmop. tróp.

N. v. Caña de la India, Achira.

Del Perú y Antillas; se propaga expontáneamente en tierras que hayan sido labradas, pero se ve generalmente en quintas, jar-

© Biblioteca Nacional de España

dines ó proximidad de las poblaciones rurales, donde luce sus flores y sus hojas ornamentales. Los rizomas son diuréticos y diaforéticos y se emplean para curar las enfermedades de la piel; con las flores, que se ven en Diciembre, se imita el color del azafrán; de las semillas se extrae una harina que se emplea para usos del tocador, haciéndose con las mismas rosarios rústicos. (1)

BROMELIACEAS

Tillandsia L.

Tillandsia usneoides L. Sp. Pl. ed. II. 411. Am. bor. et austr.

N. v. Barbas del monte

Planta epifita que vive sobre ciertos árboles y pende de ellos como cabelleras ó barbas. Sirve para rellenar pieles de animales; colchones y almohadas que se dice preservan de reumas y dolores de muelas; es útil para envolver objetos frágiles en los trasportes, la planta hecha polvo y unida á un cuerpo graso se aplica á las almorranas como astringente.

Tillandsia macrocnemis Gris. in Goett. Abh. XXIV. (1879. 332. = T. xiphioides.

N. v. Clavel blanco del aire

Vive sobre las piedras ó árboles viejos, da flores de puro color blanco que despiden un delicioso aroma, por cuya razón es muy buscada; antes abundaba en el Cerro de Perico Flaco, pero ya se ha extinguido. Con las flores se hace una tisana que se aplica para el dolor de corazón; de las hojas se puede extraer una fibra textil.

(1) Los nombres precedidos de un asterisco corresponden á plantas exóticas.

© Biblioteca Nacional de España

Tillandsia Arequitae André
N. v. Clavel de Arequita

Abunda mucho en el cerro de Arequita, da hermosas flores blancas, pero que carecen de fragancia. Se usa para formar coronas y otros adornos en los patios.

Tillandsia dianthoidea Rossi, Cat. Pl. Hart. Modoct. 79. t. 1.— Bras.
N. v. Clavel azul del aire

Frecuentísima en nuestros montes; la flor se ve desde Octubre, de pétalos azules y brácteas rojas, muy empleada en adornos de casas ó jardines.

Tillandsia ixioides Gris. in Goett. Abh. XXIV. (1879) 333.— Reg. Argent.
N. v. Clavel amarillo del aire

Epifita que vive sobre ciertos árboles y se destina á adornos de patios ó jardines.

DYCKIA Schult.
Dyckia Sp.

Vive en los cerros, en las hendiduras de las rocas, sobre éstas, con hojas llenas de aguijones en los bordes; las flores son de color amarillo de oro. Existen dos especies.

IRIDÁCEAS
CYPELLA Herb.
Cypella Herberti Herb. Bot. Mag. sub. t. 2637—Bras.

Hermosa iridea de lugares frescos ó húmedos, frecuente, de flores amarillo-dorado, cuya floración se prolonga mucho; tendría

© Biblioteca Nacional de España

un lugar distinguido en los jardines si se hiciese conocer. Las cebollas asadas ó cocidas son comestibles y no de mal sabor.

Cypella plumbea Lindl. Bot. Reg. (1838) Misc. 71.—Bras.
N. v. Bibí

Muy general en algunos lugares y alegra los paisajes del campo con sus lindas flores color celeste-violáceo, de suave fragancia; las cebollas son comestibles asadas ó cocidas, de sabor agradable.

HERBERTIA Sweet

Herbertia stricta Gris. in Goett. Abh. XXIV. (1879) 324.—Reg. Argent.

N. v. Bibí.

Muy general en algunos campos cespedosos, con flores azulado-violáceas; las papas ó cebollas son comestibles, cocidas ó asadas en el rescoldo.

SISYRINCHIUM. L

Sisyrinchium vaginatum Spreng. Syst. I 166.—Am. trop.
N. v. Canchalagua

Indígena; se usa como depurativo y diaforético el agua de la planta.

Sisyrinchium chilense Hook. Bot. Mag. t. 2786—Am. trop.
N. v. ojo del diablo, Yerba del terutero.

Cunde mucho en algunos lugares, con preferencia en los frescos, causando daño á las pasturas por el lugar que ocupa, pues además de ser muy tenaz sus ramas no la pastan ni el vacuno ni el caballar sino obligados por el hambre; las flores son celestes con estrías violáceas y la raíz roja.

© Biblioteca Nacional de España

AMARILIDÁCEAS

Agave L.

* **Agave americana** L. Sp. Pl. 323. Am. trop.

N. v. Pita

En otros tiempos se empleó mucho en guarnecer zanjas y cercos, pero hoy sólo se destina como planta ornamental sin embargo de las muchas aplicaciones que tiene. Los tallos ó pitones que arroja la planta cuando va á florecer, de 6 y más metros de altor, se utilizan en construcciones rurales y el meollo que llena el interior se emplea para hacer asentadores de navajas, para cubrir el fondo de las cajas en que se guardan colecciones de insectos, para yesca ú otros usos; con el jugo que se extrae de la planta, fermentado convenientemente, se hace la bebida *pulque;* de las hojas se extrae una fibra excelente para tejidos; en cuanto su propiedad medicinal es diurética, pero las pencas cortadas, asadas al rescoldo, se aplican en casos de pasmo, sobre la herida.

Hyppeastrum Herb.

Hyppeastrum bifidum Baker, l. c. Reg. Argent.

Amarilidea muy vistosa por su color rojo-rubí, que se presenta en lugares frescos y rivereños.

LILIÁCEAS

Herreria Ruiz &. Pav.

Herreria Montevidensis Klotzsch, ex Gris l. c.—Reg. Argent.

N. v. Zarzaparrilla.

Este vegetal es subsedáneo de la verdadera zarzaparrilla y así se emplean las raíces en las enfermedades venéreas y como depurativas.

© Biblioteca Nacional de España

NOTHOSCORDUM Kunth.

Nothoscordum sellowianum Kunth, l. c. 460=Allium sellowianum

N. v. Lágrimas de la Virgen.

Es una flor humilde pero simpática, pequeña, con alguna fragancia y muy general en algunos años. El cocimiento de la planta se usa en las enfermedades venéreas en bebida é inyecciones.

PONTEDERIÁCEAS

EICHHORNIA Kunth.

Eichhornia azurea Kunth, Enum. Pl. IV. 129.—Am. trop.

N. v. Aguapé.

Planta acuática de hermosas flores azulado-violáceo, de Noviembre á Febrero y de hojas muy ornamentales, de forma subredondas. Las flores y planta son diuréticas; las flores son cordiales; el cocimiento de raíces y hojas secas en vino se da en disenteria, gonorrea y flores blancas; las hojas frescas aplicadas en la frente calman el dolor de cabeza.

PONTEDERIA L.

Pontederia cordifolia Mart. in Schult. p. Syst. VII. 1442=rotundifolia.

N. v. Camalote.

Vive en la orilla de los rios ó lagunas, las cuales arrastran las aguas cuando se ponen torrentosas y las llaman entonces camalotes al ir flotando; la flor es azul celeste en panícula. El jugo de las flores y hojas se considera sedativo y afrodisíaco.

© Biblioteca Nacional de España

Pontederia rotundifolia L. p. Suppl. 192. Guian.

Planta ornamental para fuentes ó aguas; flores chicas, celestes, en espiga.

COMMELINACEAS

COMMELINA Plum.

Commelina sulcata Benth. in Hook. Niger fl. 541.=Vogelii.

N. v. Yerba de Santa Lucía.

Planta muy general, las flores son de un hermoso azul celeste, de Noviembre en adelante, siendo de sentirse sean tan efímeras. Las brácteas que guardan las flores encierran un líquido mucilaginoso, el cual se aplica á los ojos para curar la irritación; se dice que el jugo de la planta verde calma el prurito del sarpullido; el decotado se da cuando existen esputos de sangre.

ESMILÁCEAS

SMILAX L.

Smilax montevidensis Hort. ex Steud. Nom. ed. II. II. 599, nomen (Quid?) Reg. Argent.

N. v. Zarzaparrilla.

Planta trepadora, espinosa, flores insignificantes, Octubre; la raíz es de propiedad depurativa y sudorífica y se aplica en casos de sífilis, gota y reumatismo; los frutos pueden servir para dar color al vino.

PALMAS

Cocos L.

Cocos yatai Mart. Palmet. Orb. 93. Reg. Argent.

N. v. Yatai.

Se eleva hasta 10 metros en algunos lugares, de esbelto porte,

© Biblioteca Nacional de España

pues sus hojas forman una capa sobre el tronco completamente desnudo, presentándose siempre en grupos más ó menos densos; presenta la fruta en grandes racimos color amarillo rojizo, que maduran en Febrero y Marzo, comestibles; si se corta el racimo antes de abrir las flores, mana del corte gran cantidad de savia, que si se recoje fermenta con gran rapidez y constituye un líquido alcohólico, del cual puede extraerse el alcohol por medio de destilación. Hirviéndose los cocos dan un aceite que puede usarse en la comida y hacerse vinagre; las hojas se pueden aplicar á la fabricación de sombreros; el cogollo ó sea la médula, *palmito*, es nutritivo y agradable, crudo ó cocido. La madera ó el estipa no tiene aplicación pues se pudre muy luego de cortada. Este árbol se ve con frecuencia en los departamentos al norte del Río Negro y á su reunión le llaman Palmares. Con los frutos puestos en aguardiente se obtiene un rico licor.

Cocos dátil Drude et Gris. in Goett. Abh. XXIX. (1879) 283 Reg. Argent.

N. v. Butiá, dátil.

Hermosa palma, no alta, de hojas pinadas que forman una densa copa, que vive en lugares frescos ó húmedos, en los departamentos de Rocha, Treinta y Tres, Maldonado, Minas y otros. Magnífico árbol para ocupar un lugar en los parques ó jardines. Da racimos muy poblados de fruta, en Marzo Abril, de color amarillo rojizo, de sabor ácido dulce, agradable, comestibles.

TRITHRINAX Mart.

Trithrinax brasiliensis Mart. Hist. Nat. Palm. II. 150 Bras.

N. v. Palma de escoba.

Palmera de 3 metros ó más, hojas flambeliformes ó sean en forma de abanico, lo cual las hace propias para pantallas y se emplean en la campaña para construír escobas; los frutos que sos-

© Biblioteca Nacional de España

tiene el espádice son pequeños, de color oscuro cuando maduros y no comestibles ni tampoco la almendra, que es aceitosa; se sacan fibras de las hojas para confeccionar sombreros y otros objetos. Los peciolos, aplanados en la base, que abrazan al espádice, son envueltos en el pié por una especie de tela ó malla muy resistente, que puede tener útiles aplicaciones.

ALISMACEAS

Sagittaria Rupp.

Sagittaria montevidensis Scham. et Schlecht. in Linnaea. II (1827) 156 Reg. Argent.

N. v. Achira.

Planta acuática; las hojas se usan dentro de la copa del sombrero contra los ardores del sol y como preservativo de insolaciones; las mismas son rubefacientes, refrigerantes y se recomiendan en cataplasma en casos de hernias recientes.

Echinodorus Rich.

Echinodorus grandiflorus Micheli in DC. Monog. Phan. III, 57 E. = floribundus.

N. v. Achira del agua

Vive en las márgenes de los arroyos y lagunas, dentro de la misma agua, siendo aparente como planta ornamental en lugares húmedos, pues además de sus grandes hojas largamente peciladas da muchas flores blancas, en Noviembre-Diciembre.

CIPERACEAS

Cyperus (Mich.) L.

Cyperus reflexus Vahl. Enum. II. 42 — Reg. Argent.

N. v. Negrillo

Esta ciperacea es de propiedades diaforéticas y diuréticas; la

© Biblioteca Nacional de España

infusión de los rizomas se administra en casos de gonorrea y enfermedades de las vías urinarias y aún en fiebre intermitente.

En esta extensa familia existen muchas de sus especies íntimamente mezcladas, en algunos lugares, con las gramíneas y aquellas son igualmente pacidas con éstas por los ganados, ayudando á su alimentación aunque son mucho más pobres en principios nutritivos y esto sucede más particularmente en los campos frescos ó húmedos, pero en todos los terrenos se ven algunas de sus especies.

Scirpus L.

Scirpus riparius J. et C. Presl. Rel. Haenk. I. 193—Am. austr; Calif.

N. v. Junco

Muy diseminado en nuestros ríos, arroyos y esterales; es un poderoso elemento para asegurar el solevantamiento de los fondos de los ríos, pues deteniendo los cuerpos minerales ú orgánicos que arrastran las aguas, les da amparo y consistencia con sus ramas y rizomas y propios despojos anuales, dando así lugar á la formación de bajíos é islas, realizándose esta obra con más rapidez de lo que generalmente se cree y la prueba está palpable en el Uruguay y Río Negro. Por lo demás esta ciperacea se emplea en construcciones rurales en techos, para formar tabiques ó paredes interiores, en quinchas de carretas, trojas, etc. (1)

(1) Se habrá notado que empleo para la designación de las plantas los nombres científicos y los vulgares sólo en segundo término y esto se impone porque los vegetales en el mayor número de los casos carecen de nombre vulgar y cuando lo tienen no es de conocimiento general, pues en unas localidades se les da un nombre y otros en otras, y si así se usaran, se daría lugar á confusiones perjudiciales: existen nombres que designan plantas completamente diferentes en formas y propiedades.

© Biblioteca Nacional de España